

PUNCTELIA BORRERI
(SM.) KROG



Caratteri morfologici

- Tallo folioso a lobi larghi, da grigio a grigio marrone, liscio.
- Lobi ampi 6-10 mm, allungati, contigui, con margini arrotondati. Pruina alla periferia
- Psudocifelle puntiformi
- Soredi farinosi, biancastri. Sorali maculiformi.
- Superficie inferiore nera, marrone ai margini.
- Rizine semplici, nere.
- Apoteci rari, lecanorini, sessili, con disco marrone.
- Fotobionte clorococcoide.

Caratteri chimici

- Tallo K+ giallo, C-, KC-, P-.
- Soredi K-, C+ rosso, KC+ rosso, P-.
- Medulla K-, C+ rosso, KC+ rosso, P-.

Caratteri ecologici

- Lichene mesofitico che si insedia prevalentemente su alberi decidui.
- Predilige substrati subacidi, tollera irradiazione solare diretta e livelli di eutrofizzazione moderati.
- In provincia di Trieste non è molto frequente ed è stata rinvenuta soprattutto nella sua porzione centro-settentrionale.

Specie simili

- *Punctelia subrudecta*: si differenzia per l'assenza di pruina al margine dei lobi e per la superficie inferiore e le rizine che sono chiare.