

PUNCTELIA SUBRUDECTA
(NYL.) KROG



Caratteri morfologici

- Tallo folioso a lobi larghi, da grigio a grigio marrone.
- Lobi ampi 6-10 mm, allungati, contigui, con margini arrotondati.
- Psudocifelle puntiformi.
- Soredi farinosi, biancastri. Sorali maculiformi.
- Superficie inferiore chiara, soprattutto ai margini.
- Rizine semplici, chiare.
- Apoteci rari, lecanorini, sessili, fortemente costretti, con disco marrone.
- Fotobionte clorococcoide.

Caratteri chimici

- Tallo K+ giallo, C-, KC-, P-.
- Soredi K-, C+ rosso, KC+ rosso, P-.
- Medulla K-, C+ rosso, KC+ rosso, P-.

Caratteri ecologici

- Lichene meso-xerofitico che trova il suo optimum nella fascia submediterranea, comune anche in quella mediterranea umida.
- Predilige substrati da sub-acidi a sub-basici, tollera forte irradiazione solare e livelli di eutrofizzazione moderati.
- In provincia di Trieste è pressoché ubiquitaria ed è in grado di spingersi sino ai limiti del deserto lichenico.

Specie simili

- *Punctelia borreri*: si differenzia per la presenza di pruina al margine dei lobi e per la superficie inferiore e le rizine nere.